

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

МАТЕМАТИКА

22.05.2015 г. – ВАРИАНТ 1

Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбелязвайте в листа за отговори!

1. Кое е най-голямото от посочените числа?

- А) $\sqrt{(-2)^2}$ Б) $\sqrt[4]{8}$ В) $\sqrt[3]{-4}$ Г) 16^0

2. Ако $a = 2^{\frac{2}{3}}$, а $b = 2^{-\frac{3}{2}}$, то ab е равно на:

- А) 2^{-1} Б) $2^{-\frac{4}{9}}$ В) $2^{-\frac{5}{6}}$ Г) 2^{-5}

3. Множеството от допустимите стойности на израза $A = \frac{1}{|x| + \sqrt{2}}$ е:

- А) $x \in (-\infty; +\infty)$ Б) $x \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; +\infty)$
В) $x \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ Г) $x \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$

4. Решенията на неравенството $\frac{(x-2)^2(x+1)}{x-3} < 0$ са:

- А) $x \in (-1; 3]$ Б) $x \in (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$
В) $x \in (-1; 2) \cup (3; +\infty)$ Г) $x \in (-1; 2) \cup (2; 3)$

5. Стойността на израза $\lg \frac{1}{100} + \log_2 64 - \log_{\frac{1}{3}} 27 + \log_5 1$ е равна на:

- А) 1 Б) 2 В) 5 Г) 7

6. НЕВЯРНОТО твърдение за функцията $f(x) = x^2 - 2x$ е:

- А) Стойността на функцията $f(x)$ при $x = 0$ е равна на 0.
- Б) Графиката на функцията $f(x)$ е парабола.
- В) Функцията $f(x)$ е дефинирана за всяко x .
- Г) Графиката на функцията $f(x)$ е симетрична спрямо ординатната ос Oy .


7. Кое от уравненията има два отрицателни реални корена?

- А) $-3x^2 + 7x + 2 = 0$
- Б) $3x^2 + 7x + 2 = 0$
- В) $-3x^2 + 7x - 2 = 0$
- Г) $3x^2 + 7x - 2 = 0$

8. Изразът $\cos \alpha \cdot \cos(90^\circ + \alpha)$ е тъждествено равен на:


- А) $\sin 2\alpha$
- Б) $-\frac{1}{2} \sin 2\alpha$
- В) $-\cos^2 \alpha$
- Г) $\cos^2 \alpha$

9. В правоъгълния $\triangle ABC$ ($\sphericalangle ACB = 90^\circ$) височината CH дели хипотенузата AB на отсечки $AH = 2$ cm и $BH = 8$ cm. Тангенсът на $\sphericalangle CBA$ е равен на:



- А) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
- Б) $\frac{\sqrt{5}}{5}$
- В) $\frac{1}{2}$
- Г) 2

10. На чертежа $MN \parallel AB$. Ако $MO : OA = 3 : 5$, то отношението $CN : NA$ е равно на:



- А) 3 : 5
- Б) 5 : 3
- В) 2 : 3
- Г) 3 : 2

11. Ако x_1 и x_2 са реалните корени на уравнението $3x^2 - 14x + 6 = 0$, то сумата от реципрочните им стойности е равна на:

- А) $-\frac{14}{3}$
- Б) $-\frac{7}{6}$
- В) $\frac{3}{14}$
- Г) $\frac{7}{3}$

12. Ако n е естествено число, то първите четири члена на числова редица с общ член

$$a_n = \frac{(-1)^{1-n} \cdot n}{n+1} \quad \text{са:}$$

А) $\frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}$

Б) $\frac{1}{2}; -\frac{2}{3}; \frac{3}{4}; -\frac{4}{5}$

В) $\frac{1}{2}; -\frac{2}{3}; -\frac{3}{4}; -\frac{4}{5}$

Г) $\frac{1}{2}; -\frac{2}{3}; -\frac{3}{4}; \frac{4}{5}$

13. Намерете първия член на аритметична прогресия, ако $a_4 = 1$ и $a_7 = -11$.


А) -11

Б) -4

В) 13

Г) 17

14. Ако за $\sphericalangle AOB$ е дадено, че върхът му е точката O на чертежа, лъчът OA съвпада с положителната посока на оста Ox и $\text{tg} \sphericalangle AOB = \sqrt{3}$, то лъчът OB лежи:



А) само в I квадрант

Б) в I или в III квадрант

В) във II или в IV квадрант

Г) само в III квадрант

15. В купа има 5 сини и 12 бели жетона. Каква е вероятността при едновременно изтегляне на два жетона точно един от тях да е бял?

А) $\frac{C_5^2 \cdot C_{12}^2}{C_{17}^2}$

Б) $\frac{C_{17}^2}{C_5^1 \cdot C_{12}^1}$

В) $\frac{C_5^1 + C_{12}^1}{C_{17}^2}$

Г) $\frac{C_5^1 \cdot C_{12}^1}{C_{17}^2}$

16. В школа по танци участват 6 души на възраст 15 г., 9 г., 36 г., 17 г., 28 г. и 21 г. На каква възраст е новодошъл участник в школата, ако медианата на статистическия ред от първоначалните 6 данни съвпада с медианата на статистическия ред от новополучените 7 данни за възрастта на участниците в школата?


А) 18

Б) 19


В) 20

Г) 26,5

24. На чертежа четириъгълникът $ABCD$ е описан около окръжност с радиус 2 и $AD+BC=9$. Изразете чрез числото π лицето на фигурата, получена от четириъгълника след „изрязване“ на вписания в него кръг.



25. Точките M и N лежат съответно на страните AC и BC на $\triangle ABC$, $AM = 2CM$, $CN = 2BN$ и $S_{\triangle MNC} = 14 \text{ cm}^2$. Намерете лицето на $\triangle ABC$.



Пълните решения с необходимите обосновки на задачите от 26. до 28. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

26. Решете уравнението $(x+1)(x-2)(x+3)+(x-1)(x+3)(x-5)+(x+3)(x-2)(x-3)=0$.

27. Кодът на сейф се състои от 4 различни цифри и не започва с нула. Известно е, че числото, образувано от първите две цифри (цифрата на хилядите и стотиците), е квадрат на естествено число. Най-много колко различни опита са необходими, за да се отвори сейфът?

28. Даден е $\triangle ABC$ със страна $AB = a$ и $\sphericalangle BAC = 30^\circ$. Построена е окръжност k , която минава през върха B на $\triangle ABC$, пресича страната му AB в точка D и се допира до AC в точка C . Намерете радиуса на окръжността, ако $AD:DB = 1:2$.

ФОРМУЛИ

Квадратно уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0 \quad D = b^2 - 4ac \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \quad \text{при } D \geq 0$$
$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) \quad \text{Формули на Виет: } x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Квадратна функция

Графиката на $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ е парабола с връх точката $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{D}{4a}\right)$

Корен. Степен и логаритъм

$$\sqrt[k]{a^{2k}} = |a| \quad \sqrt[2k+1]{a^{2k+1}} = a \quad \text{при } k \in \mathbb{N}$$
$$\frac{1}{a^m} = a^{-m}, \quad a \neq 0 \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} \quad \sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a} \quad \sqrt[k]{a^{mk}} = \sqrt[k]{a^m} \quad \text{при } a \geq 0, k \geq 2, n \geq 2 \text{ и } m, n, k \in \mathbb{N}$$
$$a^x = b \Leftrightarrow \log_a b = x \quad a^{\log_a b} = b \quad \log_a a^x = x \quad \text{при } a > 0, b > 0 \text{ и } a \neq 1$$

Комбинаторика

Брой на пермутациите на n елемента: $P_n = n \cdot (n-1) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$

Брой на вариациите на n елемента k -ти клас: $V_n^k = n \cdot (n-1) \dots (n-k+1)$

Брой на комбинациите на n елемента k -ти клас: $C_n^k = \frac{V_n^k}{P_k} = \frac{n \cdot (n-1) \dots (n-k+1)}{k \cdot (k-1) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1}$

Вероятност за настъпване на събитието A :

$$p(A) = \frac{\text{брой на благоприятните случаи}}{\text{брой на възможните случаи}}, \quad 0 \leq p(A) \leq 1$$

Прогресии

Аритметична прогресия: $a_n = a_1 + (n-1)d$ $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n$

Геометрична прогресия: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ $S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}, \quad q \neq 1$

Формула за сложна лихва: $K_n = K \cdot q^n = K \cdot \left(1 + \frac{P}{100}\right)^n$

Зависимости в триъгълник и успоредник

Правоъгълен триъгълник: $c^2 = a^2 + b^2$ $S = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}ch_c$ $a^2 = a_1c$ $b^2 = b_1c$

$h_c^2 = a_1b_1$ $r = \frac{a+b-c}{2}$ $\sin \alpha = \frac{a}{c}$ $\cos \alpha = \frac{b}{c}$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$ $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{b}{a}$

Произволен триъгълник:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \quad \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

Формула за медиана:

$$m_a^2 = \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 - a^2) \quad m_b^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2c^2 - b^2) \quad m_c^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2b^2 - c^2)$$

Формула за ъглополовяща: $\frac{a}{b} = \frac{n}{m}$ $l_c^2 = ab - mn$

Формула за диагоналите на успоредник: $d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2$

Формули за лице

Триъгълник: $S = \frac{1}{2}ch_c$ $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$ $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

$$S = pr \quad S = \frac{abc}{4R}$$

Успоредник: $S = ah_a$ $S = ab \sin \alpha$ Трапец: $S = \frac{a+b}{2}h$

Четириъгълник: $S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi$

Описан многоъгълник: $S = pr$

Тригонометрични функции

α°	0°	30°	45°	60°	90°
$\alpha \text{ rad}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	–
$\operatorname{cotg} \alpha$	–	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

	$-\alpha$	$90^\circ - \alpha$	$90^\circ + \alpha$	$180^\circ - \alpha$
sin	$-\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$
cos	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$
tg	$-\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{cotg} \alpha$	$-\operatorname{cotg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$
cotg	$-\operatorname{cotg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{cotg} \alpha$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$

$$\operatorname{cotg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{cotg} \alpha \operatorname{cotg} \beta \mp 1}{\operatorname{cotg} \beta \pm \operatorname{cotg} \alpha}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

$$\operatorname{cotg} 2\alpha = \frac{\operatorname{cotg}^2 \alpha - 1}{2 \operatorname{cotg} \alpha}$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\alpha)$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha)$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$$

$$1 + \cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta))$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta))$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$$